

| 위치                    | 오류유형      | 수정 전                                                                                                                                                                  | 수정 후                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1권<br>116p<br>번호 : 07 | 해설        | <ul style="list-style-type: none"> <li>철분 흡수 증가 요인 : 임신, 성장기, 수유기 등 체내요구량이 높을 경우와 heme철, 아미노산, 설탕, 유기산, 비타민 C, Ca(인산이나 피트산과 먼저 결합하여 제거하므로 철 흡수를 도움) 등이 있다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>철분 흡수 증가 요인 : 임신, 성장기, 수유기 등 체내요구량이 높을 경우와 heme철, 아미노산, 설탕, 유기산, 비타민 C, <del>Ca(인산이나 피트산과 먼저 결합하여 제거하므로 철 흡수를 도움)</del> 등이 있다.</li> </ul> <p>(삭제)</p> |
| 1권<br>487p<br>번호 : 12 | 문제-문항     | ④ 급성기가 지나면 <b>고</b> 열량, 고단백질, 고비타민식의 연식을 취한다.                                                                                                                         | ④ 급성기가 지나면 <b>저</b> 열량, 고단백질, 고비타민식의 연식을 취한다.                                                                                                                                                |
| 1권<br>535p<br>번호 : 06 | 문제-문항     | ④ 다뇨가 있을 때에는 적량의 수분을 공급한다.                                                                                                                                            | ④ 에너지 밀도가 높은 식품의 섭취를 제한한다.                                                                                                                                                                   |
| 1권<br>535p<br>번호 : 06 | 해설        | 다뇨가 있을 때에는 나트륨을 제한해야 한다.                                                                                                                                              | 체조직 분해를 방지하기 위해 에너지를 충분히 섭취한다.                                                                                                                                                               |
| 1권<br>605p<br>번호 : 11 | 문제-보기(지문) | 세포질에 대한 설명으로 <b>옳지 않은</b> 것은?                                                                                                                                         | 세포질에 대한 설명으로 <b>옳은</b> 것은?                                                                                                                                                                   |
| 1권<br>667p<br>번호 : 08 | 문제-문항     | ⑤ CO <sub>2</sub> 분압이 낮을 때, 해리반응이 <b>감소한다</b> .                                                                                                                       | ⑤ CO <sub>2</sub> 분압이 낮을 때, 해리반응이 <b>촉진된다</b> .                                                                                                                                              |

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.  
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.