

위치	오류유형	수정 전	수정 후				
278p 번호 : 31	문제-본문	31 어깨위팔뼈리듬(Scapulohumeral Rhythm)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 가. 오목위팔관절(관절와상완관절 ; Glenohumeral Rhythm)의 어깨의 벌림이나 굽힘은 어깨뼈의 위쪽돌림과 함께 일어나며, 이를 어깨위팔뼈리듬이라 한다. 나. 어깨위팔뼈리듬은 대부분의 벌림 동작에서 위팔뼈와 날개뼈가 1:1의 비율로 일어난다. 다. 초기 어깨의 벌림 0~30도 사이에는 날개뼈(견갑골 ; Scapula)의 움직임이 일어나지 않는다. 라. 중기 어깨의 벌림 30~90도 사이에는 날개뼈(견갑골 ; Scapula)와 위팔뼈(상완골 ; Humeral)가 <u>2:1</u>의 비율로 일어난다.	31 어깨위팔뼈리듬(Scapulohumeral Rhythm)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 가. 오목위팔관절(관절와상완관절 ; Glenohumeral Rhythm)의 어깨의 벌림이나 굽힘은 어깨뼈의 위쪽돌림과 함께 일어나며, 이를 어깨위팔뼈리듬이라 한다. 나. 어깨위팔뼈리듬은 대부분의 벌림 동작에서 위팔뼈와 날개뼈가 1:1의 비율로 일어난다. 다. 초기 어깨의 벌림 0~30도 사이에는 날개뼈(견갑골 ; Scapula)의 움직임이 일어나지 않는다. 라. 중기 어깨의 벌림 30~90도 사이에는 날개뼈(견갑골 ; Scapula)와 위팔뼈(상완골 ; Humeral)가 <u>1:2</u>의 비율로 일어난다.				
292p	문제-본문	<table><tr><td>가족력</td><td>부친, 형제 중 55세 이전에 또는 모친, 자매 중 60세 이전에 심근경색, 관상동맥혈관 재개통술 또는 급사한 가족 있음</td></tr></table>	가족력	부친, 형제 중 55세 이전에 또는 모친, 자매 중 60세 이전에 심근경색, 관상동맥혈관 재개통술 또는 급사한 가족 있음	<table><tr><td>가족력</td><td>부친, 형제 중 55세 이전에 또는 모친, 자매 중 65세 이전에 심근경색, 관상동맥혈관 재개통술 또는 급사한 가족 있음</td></tr></table>	가족력	부친, 형제 중 55세 이전에 또는 모친, 자매 중 65세 이전에 심근경색, 관상동맥혈관 재개통술 또는 급사한 가족 있음
가족력	부친, 형제 중 55세 이전에 또는 모친, 자매 중 60세 이전에 심근경색, 관상동맥혈관 재개통술 또는 급사한 가족 있음						
가족력	부친, 형제 중 55세 이전에 또는 모친, 자매 중 65세 이전에 심근경색, 관상동맥혈관 재개통술 또는 급사한 가족 있음						
312~312p 두번째 그림	문제-본문	등 뒤로 손닿기 검사(Back Scratch Test) · 검사 목적 : 노인체력평가를 위한 하지의 유연성 검사 · 검사 방법 : 편안히 선 상태에서 한 손을 머리 뒤로 넘기고, 반대쪽 손은 등 뒤로 돌려 손바닥이 보이도록 실시한다. 측정은 자를 이용하여 측정하며 손가락이 닿지 않으면 (-)로 중지가 겹치면 (+)로 기록한다. 단위는 cm단위로 실시하고 무리한 동작으로 부상을 입지 않도록 주의한다.	등 뒤로 손닿기 검사(Back Scratch Test) · 검사 목적 : 노인체력평가를 위한 상지의 유연성 검사 · 검사 방법 : 편안히 선 상태에서 한 손을 머리 뒤로 넘기고, 반대쪽 손은 등 뒤로 돌려 손바닥이 보이도록 실시한다. 측정은 자를 이용하여 측정하며 손가락이 닿지 않으면 (-)로 중지가 겹치면 (+)로 기록한다. 단위는 cm단위로 실시하고 무리한 동작으로 부상을 입지 않도록 주의한다.				
437p 번호 : 9	문제-보기(지문)	라. 하루 10mg 이상의 식염섭취 시 고혈압을 유발한다.	라. 하루 10g 이상의 식염섭취 시 고혈압을 유발한다 .				
483p 번호 : 31	문제-본문	31. 라.민감도 공식 = (TP ; 진양성) / [(TP ; 진양성)+(FN ; 가음성)]	31. 라.민감도 공식 = (TP ; 진양성) / [(TP ; 진양성)+(FN ; 가음성)] × 100				
494p	문제-본문	<table><tr><td>가족력</td><td>부친, 형제 중 55세 이전에 또는 모친, 자매 중 60세 이전에 심근경색, 관상동맥혈관 재개통술 또는 급사한 가족 있음</td></tr></table>	가족력	부친, 형제 중 55세 이전에 또는 모친, 자매 중 60세 이전에 심근경색, 관상동맥혈관 재개통술 또는 급사한 가족 있음	<table><tr><td>가족력</td><td>부친, 형제 중 55세 이전에 또는 모친, 자매 중 65세 이전에 심근경색, 관상동맥혈관 재개통술 또는 급사한 가족 있음</td></tr></table>	가족력	부친, 형제 중 55세 이전에 또는 모친, 자매 중 65세 이전에 심근경색, 관상동맥혈관 재개통술 또는 급사한 가족 있음
가족력	부친, 형제 중 55세 이전에 또는 모친, 자매 중 60세 이전에 심근경색, 관상동맥혈관 재개통술 또는 급사한 가족 있음						
가족력	부친, 형제 중 55세 이전에 또는 모친, 자매 중 65세 이전에 심근경색, 관상동맥혈관 재개통술 또는 급사한 가족 있음						

위치	오류유형	수정 전	수정 후
505~505p 두번째 그림	문제-본문	등 뒤로 손닿기 검사(Back Scratch Test) · 검사 목적 : 노인체력평가를 위한 하지의 유연성 검사 · 검사 방법 : 편안히 선 상태에서 한 손을 머리 뒤로 넘기고, 반대쪽 손은 등 뒤로 돌려 손바닥이 보이도록 실시한다. 측정은 자를 이용하여 측정하며 손가락이 닿지 않으면 (-)로 중지가 겹치면 (+)로 기록한다. 단위는 cm단위로 실시하고 무리한 동작으로 부상을 입지 않도록 주의한다.	등 뒤로 손닿기 검사(Back Scratch Test) · 검사 목적 : 노인체력평가를 위한 상지의 유연성 검사 · 검사 방법 : 편안히 선 상태에서 한 손을 머리 뒤로 넘기고, 반대쪽 손은 등 뒤로 돌려 손바닥이 보이도록 실시한다. 측정은 자를 이용하여 측정하며 손가락이 닿지 않으면 (-)로 중지가 겹치면 (+)로 기록한다. 단위는 cm단위로 실시하고 무리한 동작으로 부상을 입지 않도록 주의한다.
743p 번호 : 7	시험지-설명	7번 정답 ①	7번 정답 없음 - 모든 문항이 옳은 문항으로, 시행처 출제오류로 조심스럽게 판단됩니다.
832p 번호 : 12	해설	12번 해설 12. 척수신경은 감각·운동·자율신경으로 나뉘며, 신체 대부분의 팔·다리 근육의 감각 및 운동을 담당한다. 운동신경의 경우 목·팔·허리·엉덩이의 인접한 신경들끼리 열기를 형성하여 운동기능을 담당한다. ② 어깨 벌림의 제한된 움직임은 C5~C6 척수신경과 관련이 있다. ③ 무릎굽힘의 제한된 움직임은 L4~S3의 척수신경 손상과 관련이 있다. ④ 발바닥굽힘의 제한된 움직임은 L4~S3의 척수신경 손상과 관련이 있다.	12번 해설 12. 척수신경은 감각·운동·자율신경으로 나뉘며, 신체 대부분의 팔·다리 근육의 감각 및 운동을 담당한다. 운동신경의 경우 목·팔·허리·엉덩이의 인접한 신경들끼리 열기를 형성하여 운동기능을 담당한다. ② 어깨 벌림의 제한된 움직임은 C5~C6 척수신경과 관련이 있다. ③ 무릎굽힘의 제한된 움직임은 L4~L5의 척수 손상과 관련이 있다. ④ 발바닥굽힘의 제한된 움직임은 L5~S1의 척수신경 손상과 관련이 있다.

일부 정오의 경우 다음과 같은 사유로 인해 수정하였음을 안내드립니다.
 시행처 출제오류로 판단되는 문제의 정답표기 수정

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
 더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.